



Produktdatenblatt
EMIKO® Bio Einzelfuttermittel Nutztiere
gültig ab 11.12.2024
Version Nr. 3

Handelsname: EMIKO® Bio Einzelfuttermittel für Rinder Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel

Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
GMP+ FSA gesichert

Verfügbare Gebindegrößen

5,0l Kanister
10,0l Kanister
25,0l Kanister
250l BIBtainer
1000l BIBtainer

Verwendungszweck

Einzelfuttermittel für Nutztiere

Hergestellt aus:

- Wasser
 - Bio-Joghurt*
 - Bio-Kräuter* (Anis*, Fenchel*, Pfefferminze*, Rosmarinblätter*, Kümmel*, Goldrute*, Schafgarbe*)
- * aus kontrolliert biologischem Anbau

Fermentiert unter Verwendung von Zuckerrohrmelasse aus kontrolliert biologischem Anbau.

Physikalische Parameter

pH < 3,6

Sensorische Parameter:

- Farbe: braun, leicht trüb
- Geruch: süß-säuerlich
- Geschmack: sauer

Chemische Parameter

- Feuchte: 95,6%
- Rohprotein: 0,4%
- Rohfett: 0,4%
- Rohasche: 1,4%
- Rohfaser: 0,4%
- Natrium 0,31%
- Lysin: 0,1%
- Methionin: 0,1%



Produktdatenblatt
EMIKO® Bio Einzelfuttermittel Nutztiere
gültig ab 11.12.2024
Version Nr. 3

Haltbarkeit

- ungeöffnet mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
- Nach Anbruch zügig verbrauchen

Lagerbedingungen

Dunkel und sauber bei Raumtemperatur.

Transportbedingungen

Frostfrei.

Fütterungsempfehlung für Rinder

Kälber: Nach der Geburt 10 ml direkt ins Maul geben. Ab dem 3. Lebenstag 10 ml je Mahlzeit. Jungvieh/Milchvieh/Mast: Als Startgabe täglich 0,4% der Gesamttagesration dem Futter zugeben. Zum Erhalt täglich 0,1% der Gesamttagesration dem Futter zugeben.

Fütterungsempfehlung für Ziegen und Schafe

Lämmer: Nach der Geburt 1 ml direkt ins Maul geben. Ab dem 3. Lebenstag 2 ml je Mahlzeit. Jungvieh/Milchvieh/Mast: Als Startgabe täglich 5 ml je Mahlzeit. Zum Erhalt täglich 3 ml je Mahlzeit.

Fütterungsempfehlung für Schweine / Zuchtsauen

Ferkel: Tag 2-21: 2 ml über Milch/Wasser/Futter geben. Danach täglich 0,4% der Gesamttagesration über Milch/Wasser/Futter geben.

Zuchtsauen: 7 Tage vor bis 7 Tage nach dem Abferkeln täglich 50-60 ml je Sau. Täglich 0,4% der Gesamttagesration dem Futter zugeben.

Mast: Täglich EFM in Höhe von 0,4% der Gesamttagesration dem Futter zugeben.

Fütterungsempfehlung für Geflügel

Aufzucht/Mast/Legehennen: täglich 0,4% der Gesamttagesration dem Futter zugeben.

Einschränkungen

Wenn sich Farbe und Geruch stark verändern, sollte das Einzelfuttermittel EMIKO® Bio EFM Nutztiere nicht mehr verwendet werden.

Sonstige Hinweise:

Trockensubstanz 4,5%, davon

- I) Aus ökologischer Produktion: 100%
- II) Aus Umstellungserzeugung: 0%
- III) Aus Ausgangserzeugnissen, die nicht unter I) oder II) fallen: 0%
- IV) Landwirtschaftlichen Ursprungs: 100%